

# A Saúde Materno-Infantil no Inquérito Demográfico e de Saúde de Moçambique 2011 (IDS)

O IDS 2011 mostra a mortalidade materna elevada estimada em 408 mortes por 100.000 nascidos vivos. A mortalidade infantil também é elevada, apesar das tendências de declínio ao longo do tempo. Os cuidados de saúde que as mulheres recebem durante a gravidez, no momento do parto, e logo após o parto são importantes para a saúde materna e a saúde das crianças. Embora quase todas as mulheres fizessem pelo menos uma consulta pré-natal de


um profissional qualificado, pouco mais de metade de todos os partos ocorreram na presença de um profissional qualificado. Há também espaço para melhorias no Programa Alargado de Vacinação, com dois terços das crianças totalmente imunizadas. Doenças infantis, como

diarreia, infecção respiratória aguda, e febre continuam a ser uma ameaça como as principais causas de morbidade e mortalidade em crianças com menos de 5 anos de idade.

## Saúde Materna

### Quase Todas As Mulheres Grávidas Recebem Pelo Menos Uma Consulta Pré-Natal


% das mulheres de 15-49 anos que teve um nascimento vivo nos últimos 5 anos pelo número de visitas pré-natais com relação ao nascimento vivo mais recente



Nove em cada dez mulheres que deram luz nos cinco anos antes do inquérito tiveram pelo menos uma consulta pré-natal, e a metade delas fizeram as recomendadas quatro ou mais consultas pré-natais. Praticamente todos os cuidados pré-natais são fornecidos por pessoal qualificado, incluindo médicos, enfermeiros de saúde materno-infantil, ou parteiras.

### Mais da Metade dos Partos Ocorrem em Unidades de Saúde


% dos nascidos vivos nos cinco anos que antecederam a pesquisa, por local de atendimento



Menos da metade dos partos em áreas rurais ocorrem nas unidades sanitárias, comparado a mais de 80% em áreas urbanas. Em Moçambique, quase todas as unidades sanitárias onde ocorrem os partos estão no setor público.

### Um Profissional Qualificado Auxilia em Mais da Metade dos Partos


% dos nascidos vivos nos cinco anos que antecederam a pesquisa por tipo de auxiliador durante o parto



Entre os 18% de partos assistidos por um médico, enfermeiro ou parteira, apenas 2,5% são assistidos por um médico. A percentagem de partos assistidos por um profissional qualificado aumenta com o nível de educação e riqueza do agregado familiar.

### Atendimento Qualificado no Parto Varia Muito por Província

% dos nascidos vivos nos cinco anos que antecederam a pesquisa assistida por um profissional qualificado




O percentual de partos nos últimos cinco anos, assistidos por um profissional qualificado, varia muito entre as diferentes províncias. A taxa varia de 26% na Zambézia a 84% em Maputo Província.

## Saúde Infanto-Juvenil

### Mortalidade na Primeira Infância Está em Declínio


Mortes por 1.000 nascidos vivos nos cinco anos que antecederam a pesquisa por ano de inquérito



Enquanto a mortalidade infantil e a mortalidade nas crianças menores de cinco anos são menos da metade do que eram em 1997, as taxas continuam elevadas e variam substancialmente entre as províncias. A mortalidade infantil, por exemplo, varia de 39-95 óbitos por mil nascidos vivos.

### Dois Terços das Crianças Estão Totalmente Vacinadas

% das crianças de 12-23 meses totalmente vacinadas por quintil de riqueza



A percentagem de crianças que são completamente vacinadas aumenta com a riqueza dos agregados familiares. A vacinação

\*MICS = Inquérito de Indicadores Múltiplos (Multiple Indicator Cluster Survey)

completa consiste de BCG<sup>1</sup>, sarampo e três doses de cada vacina contra a poliomielite e DPT<sup>2</sup> (excluindo a vacina pólio dada ao nascimento).

## Aconselhamento ou Tratamento Procurado para Metade das Crianças com Diarréia

% das crianças menores de 5 anos com diarréia por tipo de tratamento


% das crianças menores de 5 anos com diarréia nas duas semanas anteriores ao inquérito



Uma em cada dez crianças menores de cinco anos teve diarreia nas duas semanas anteriores ao inquérito, mas uma em quatro delas não recebeu tratamento. A diarreia e a desidratação subsequente ainda são uma das principais causas da mortalidade infantil e a mortalidade nas crianças menores de cinco anos.

## Percentagem de Crianças de Baixo Peso é Mais Baixa entre Mães Educadas

% das crianças menores de 5 anos que estão moderadamente ou severamente abaixo do peso segundo o nível de educação da mãe



Onze por cento das crianças menores de 5 anos de idade estão moderadamente abaixo do peso e 4% estão severamente abaixo do peso. Filhos de mães com ensino secundário ou superior são muito menos prováveis de estar abaixo do peso, como também são menos propensos a estar severamente abaixo do peso em comparação com crianças cujas mães não têm educação ou ensino primário.

<sup>1</sup> Bacillus Calmette-Guérin

<sup>2</sup> Diphtheria, Pertussis e Tetanus

O Inquérito Demográfico e de Saúde de Moçambique 2011 (IDS) oferece informações atuais sobre a população e a situação da saúde em Moçambique. Após os levantamentos em 1997 e 2003, este é o terceiro Inquérito Demográfico e de Saúde nacional realizado no país. Inquéritos repetidos permitem uma análise de tendências ao longo do tempo.

O IDS foi baseado numa amostra representativa nacional e fornece estimativas a níveis nacionais e provinciais.


	Número de Entrevistados	Taxa de Respostas
Agregados Familiares	13.964	99,8%
Mulheres de 15-49 anos	13.718	98,9%
Homens de 15-64 anos	4.027	97,5%

Para obter informações adicionais sobre os resultados do IDS 2011, veja [www.measuredhs.com](http://www.measuredhs.com) ou entre em contato com:

### Instituto Nacional de Estatística

Direcção de Estatísticas Demográficas, Vitais e Sociais  
Av. 24 de Julho, nº 1989, 5º andar  
Telefone: +258-21-305528 | Fax: +258-21-305528  
E-mail: [info@ine.gov.mz](mailto:info@ine.gov.mz) | Website: [www.ine.gov.mz](http://www.ine.gov.mz)

Este folheto foi elaborado pelo Projecto Informing DEcisionmakers to Act (IDEA, Informando Tomadores de Decisões como Agir) do Population Reference Bureau (PRB), em colaboração com o Instituto Nacional de Estatística (INE), e o Ministério da Saúde (MISAU). Esta publicação foi possível graças ao generoso apoio do povo americano através da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), sob os termos do Projeto IDEA (nº AID-0AA-A-10-00009). Os conteúdos são da responsabilidade do Population Reference Bureau e não refletem necessariamente os pontos de vista da USAID ou do Governo dos Estados Unidos.



### Taxa de mortalidade infantil

Mortes de crianças por 1.000 nascidos vivos (Taxa de dez anos)



INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA



Ministério de Saúde



# A Saúde Materno-Infantil no Inquérito Demográfico e de Saúde de Moçambique 2011 (IDS)